


# Algodão

PORTFÓLIO DE

2025  
2026



**TMG**

*Alinhados* com quem deseja *produzir mais*  
e *fazer história* na cotonicultura brasileira!

Contamos com uma equipe técnica composta por pesquisadores renomados e profissionais multidisciplinares, juntamente com modernos laboratórios, nós **oferecemos um portfólio de algodão completo e multiplataforma**, que proporciona ao agricultor, mais segurança, **produtividade** e a melhor **qualidade de fibra** do mercado.

ONDE TEM  
*Algodão*  
TEM **TMG**

# TMG 83 B3XF

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- PRECOCIDADE
- EXCELENTE QUALIDADE DE FIBRA
- TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA
- FLEXIBILIDADE NO MANEJO DE PLANTAS DANINHAS

24005B3XF

★ LANÇAMENTO

EXIGÊNCIA DE  
REGULADOR  
MÉDIA

RX TOLERÂNCIA À  
RAMULÁRIA  
MÉDIA

Bollgard3  
XTENDFLEX



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **MÉDIO-PRECOCE**
- PESO CAPULHO (g): **4,5**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **43,1**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULÁRIA (R. pseudoglycines): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **RESISTENTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

MICRONAIRE

**4,0**

RESISTÊNCIA  
[gFor/Text]

**29,5**

COMPRIMENTO (mm)

**31,1**

SFI (%)

**7,6**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial

■ Época de plantio tolerada

A BIOTECNOLOGIA COM UM **XX** A MAIS.

Bollgard3  
XTENDFLEX



TOLERÂNCIA **XTENDIDA** AOS PRINCIPAIS HERBICIDAS:  
GLIFOSATO, GLUFOSINATO E DICAMBA



PRODUTIVIDADE **XTENDIDA**



QUALIDADE DE FIBRA **XTENDIDA**



PROTEÇÃO CONTRA AS PRINCIPAIS LAGARTAS



# TMG 84 B3XF

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- EXCELENTE ARRANQUE INICIAL
- QUALIDADE DE FIBRA
- TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA
- FLEXIBILIDADE NO MANEJO DE PLANTAS DANINHAS

24001B3XF

★ LANÇAMENTO

EXIGÊNCIA DE REGULADOR  
ALTA

Rx TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA  
MÉDIA

Bollgard3  
XTENDFLEX



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **MÉDIO**
- PESO CAPULHO (g): **4,4**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **42,9**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULÁRIA (R. pseudoglycines): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **RESISTENTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

MICRONAIRE

**3,8**

RESISTÊNCIA  
[gFor/Text]

**29,5**

COMPRIMENTO (mm)

**31,1**

SFI (%)

**7,3**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial

■ Época de plantio tolerada

A BIOTECNOLOGIA COM UM **XX** A MAIS.

Bollgard3  
XTENDFLEX



TOLERÂNCIA **XTENDIDA** AOS PRINCIPAIS HERBICIDAS:  
GLIFOSATO, GLUFOSINATO E DICAMBA



PRODUTIVIDADE **XTENDIDA**



QUALIDADE DE FIBRA **XTENDIDA**



PROTEÇÃO CONTRA AS PRINCIPAIS LAGARTAS



# TMG 88 B3XF

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- ESTABILIDADE PRODUTIVA
- QUALIDADE DE FIBRA
- TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA
- FLEXIBILIDADE NO MANEJO DE PLANTAS DANINHAS

24006B3XF

★ LANÇAMENTO

EXIGÊNCIA DE  
REGULADOR  
MÉDIA

RX TOLERÂNCIA À  
RAMULÁRIA  
MÉDIA

Bollgard3  
TENDFLEX



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **MÉDIO-TARDIO**
- PESO CAPULHO (g): **4,2**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **44,4**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULÁRIA (R. pseudoglycines): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **RESISTENTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

MICRONAIRE

**3,8**

RESISTÊNCIA  
[gFor/Text]

**29,4**

COMPRIMENTO (mm)

**30,5**

SFI (%)

**8,1**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial ■ Época de plantio tolerada

A BIOTECNOLOGIA COM UM **X** A MAIS.

Bollgard3  
TENDFLEX



TOLERÂNCIA **XTENDIDA** AOS PRINCIPAIS HERBICIDAS:  
GLIFOSATO, GLUFOSINATO E DICAMBA



PRODUTIVIDADE **XTENDIDA**



QUALIDADE DE FIBRA **XTENDIDA**



PROTEÇÃO CONTRA AS PRINCIPAIS LAGARTAS



# TMG 63 XF

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- ÓTIMA QUALIDADE DE FIBRA
- OPÇÃO DE REFÚGIO
- FLEXIBILIDADE NO MANEJO DE PLANTAS DANINHAS

24007XF

★ LANÇAMENTO

EXIGÊNCIA DE  
REGULADOR  
MÉDIA

PLANTE  
REFÚGIO

TENDFLEX  
TECHNOLOGY



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **MÉDIO**
- PESO CAPULHO (g): **4,0**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **44,2**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

MICRONAIRE

**4,4**

RESISTÊNCIA  
[gFor/Text]

**32,0**

COMPRIMENTO (mm)

**30,5**

SFI (%)

**7,1**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial

■ Época de plantio tolerada

A BIOTECNOLOGIA COM UM **X** A MAIS.

TENDFLEX  
TECHNOLOGY



TOLERÂNCIA **XTENDIDA** AOS PRINCIPAIS HERBICIDAS:  
GLIFOSATO, GLUFOSINATO E DICAMBA



PRODUTIVIDADE **XTENDIDA**



QUALIDADE DE FIBRA **XTENDIDA**



# TMG 33 B3RF

2301B3RF

- **PRECOCIDADE**
- **EXCELENTE QUALIDADE DE FIBRA**
- **RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE DE GALHA**
- **TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA**
- **BOM COMPORTAMENTO PARA MANCHA ALVO**

**EXIGÊNCIA DE REGULADOR MÉDIA**

**Rx TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA ALTA**

**RN RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE M. incognita**

**Bollgard<sup>3</sup> RR FLEX**



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **PRECOCE**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- PESO CAPULHO (g): **4,4**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **42,6**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**
- NEMATOIDE DA GALHA (M. incognita): **RESISTENTE\***
- RAMULÁRIA (R. pseudoglycines): **TOLERANTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **RESISTENTE**

\*Resistente é considerado quando o fator de multiplicação é <1



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

**MICRONAIRE**

**3,9**

**RESISTÊNCIA [gFor/Text]**

**31,1**

**COMPRIMENTO (mm)**

**31,0**

**SFI (%)**

**7,1**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO (mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|-----------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                       | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 90 - 105              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 90 - 105              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 90 - 105              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 90 - 105              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 90 - 110              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 90 - 110              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 90 - 110              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 90 - 110              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 90 - 110              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 90 - 110              |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial

■ Época de plantio tolerada



# TMG 38 B3RF

2303B3RF

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- EXCELENTE QUALIDADE DE FIBRA
- TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA
- EXCELENTE ARRANQUE INICIAL

**EXIGÊNCIA DE  
REGULADOR**  
MÉDIA

**Rx TOLERÂNCIA À  
RAMULÁRIA**  
MÉDIA

**Bollgard<sup>3</sup>**  
RRFLEX



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **TARDIO**
- PESO CAPULHO (g): **4,0**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **42,4**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULÁRIA (R. pseudoglycines): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **RESISTENTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

**MICRONAIRE**

**4,1**

**RESISTÊNCIA**  
[gFor/Text]

**29,9**

**COMPRIMENTO (mm)**

**31,0**

**SFI (%)**

**7,5**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial

■ Época de plantio tolerada



# TMG 31 B3RF



- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- ÓTIMA QUALIDADE DE FIBRA
- TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA

**EXIGÊNCIA DE REGULADOR MÉDIA**

**Rx TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA MÉDIA**

**Bollgard<sup>3</sup> RRFLEX**



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **MÉDIO-PRECOCE**
- PESO CAPULHO (g): **4,5**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **43,5**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULÁRIA (R. pseudoglycines): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **TOLERANTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

**MICRONAIRE**

**3,9**

**RESISTÊNCIA [gFor/Text]**

**30,4**

**COMPRIMENTO (mm)**

**30,2**

**SFI (%)**

**8,2**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO (mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|-----------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                       | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 85 - 95               |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 85 - 95               |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 85 - 95               |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 85 - 95               |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 85 - 95               |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 85 - 95               |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 85 - 95               |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 85 - 95               |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 85 - 95               |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 85 - 95               |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial ■ Época de plantio tolerada



## ARQUITETURA DE PLANTA

|                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3ª Posição / Terço Superior | 0%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Superior | 1.8%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Superior | 19.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Médio    | 3.3%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Médio    | 19.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Médio    | 44.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Inferior | 0.7%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Inferior | 2.3%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Inferior | 3.4%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vegetativo                  | 5.2%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# TMG 44 B2RF

- **ESTABILIDADE PRODUTIVA**
- **ÓTIMA QUALIDADE DE FIBRA**
- **TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA**



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **MÉDIO-PRECOCE**
- PESO CAPULHO (g): **4,5**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **42,1**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULÁRIA (R. pseudoglycines): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **TOLERANTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

MICRONAIRE

**4,0**

RESISTÊNCIA  
[gFor/Text]

**29,4**

COMPRIMENTO (mm)

**30,0**

SFI (%)

**8,3**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial

■ Época de plantio tolerada



## ARQUITETURA DE PLANTA

|                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3ª Posição / Terço Superior | 0%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Superior | 2.1%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Superior | 16.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Médio    | 3.5%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Médio    | 17.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Médio    | 35.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Inferior | 1.6%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Inferior | 6.6%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Inferior | 12.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vegetativo                  | 3.9%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# TMG 47 B2RF

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- EQUILÍBRIO NA QUALIDADE DE FIBRA
- TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA
- OPÇÃO PARA ABERTURA DE PLANTIO

**EXIGÊNCIA DE  
REGULADOR**  
BAIXA

**Rx TOLERÂNCIA À  
RAMULÁRIA**  
MÉDIA

BOLLGARD II RRFLX™



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **MÉDIO-TARDIO**
- PESO CAPULHO (g): **3,9**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **43,5**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULÁRIA (R. pseudoglycines): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **TOLERANTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

**MICRONAIRE**

**3,9**

**RESISTÊNCIA**  
[gFor/Text]

**29,0**

**COMPRIMENTO (mm)**

**31,8**

**SFI (%)**

**6,8**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial

■ Época de plantio tolerada



## ARQUITETURA DE PLANTA



|                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3ª Posição / Terço Superior | 12%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Superior | 8.6%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Superior | 29.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Médio    | 5.0%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Médio    | 13.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Médio    | 26.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Inferior | 0.6%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Inferior | 2.8%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Inferior | 5.2%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vegetativo                  | 7.2%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Controle as plantas tigueras de soja e conquiste lavouras de algodão mais produtivas e rentáveis!**

Ao optar por cultivares de soja suscetíveis às sulfonilureias (**não STS**) do portfólio TMG, o controle de plantas tigueras tolerantes ao glifosato e ao glufosinato é facilitado. Isso permite o uso de herbicidas à base de trifloxissulfurom-sódico ou piriotabaque-sódico, independentemente da biotecnologia presente na cultivar de algodão escolhida.



TMG  
**JACAREÚBA**  
E

TMG  
**MURICI**  
I2X

TMG  
**INGÁ**  
I2X

TMG  
**JATOBÁ**  
I2X

TMG  
**PAINEIRA**  
I2X

TMG  
**22E70** CE

TMG  
**2370** IPRO

TMG  
**2372** IPRO

TMG  
**2374** IPRO

TMG  
**7362** IPRO

TMG  
**7067** IPRO



# TMG 51 WS3

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- EXCELENTE QUALIDADE DE FIBRA
- TOLERÂNCIA A RAMULÁRIA
- RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE DE GALHA
- BOM COMPORTAMENTO À ROTYLENCHULUS RENIFORMIS

**EXIGÊNCIA DE  
REGULADOR**  
MÉDIA

**RX TOLERÂNCIA À  
RAMULÁRIA**  
ALTA

**RN RESISTÊNCIA AO  
NEMATOIDE**  
M. incognita

**TN TOLERÂNCIA AO  
NEMATOIDE**  
R. reniformis

**WideStrike3**  
PROTEÇÃO CONTRA INSETOS



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **MÉDIO-PRECOCE**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- PESO CAPULHO (g): **4,7**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **43,5**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**
- NEMATOIDE DA GALHA (M. incognita): **RESISTENTE\***
- RAMULÁRIA (R. pseudoglycines): **TOLERANTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **RESISTENTE**
- NEMATOIDE (R. reniformis): **TOLERANTE**

\*Resistente é considerado quando o fator de multiplicação é <1



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

**MICRONAIRE**

**4,2**

**RESISTÊNCIA  
[gFor/Text]**

**30,8**

**COMPRIMENTO (mm)**

**31,1**

**SFI (%)**

**7,1**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 75 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 75 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 75 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 75 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 75 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 75 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 75 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 75 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 75 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 75 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial ■ Época de plantio tolerada



## ARQUITETURA DE PLANTA



|                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3ª Posição / Terço Superior | 0.8%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Superior | 9.6%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Superior | 32.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Médio    | 1.7%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Médio    | 14.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Médio    | 28.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Inferior | 0%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Inferior | 0.4%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Inferior | 2.0%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vegetativo                  | 10.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# TMG 91 WS3

- CULTIVAR VIGOROSA
- EXCELENTE ARRANQUE INICIAL
- ELEVADO PESO DE CAPULHO
- INDICADO PARA ABERTURA DE PLANTIO

EXIGÊNCIA DE  
REGULADOR  
ALTA

WideStrike3  
PROTEÇÃO CONTRA INSETOS



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **TARDIO**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- PESO CAPULHO (g): **4,9**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **40,7**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **TOLERANTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

MICRONAIRE

**4,6**

RESISTÊNCIA  
[gFor/Text]

**29,4**

COMPRIMENTO (mm)

**29,0**

SFI (%)

**8,3**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 75 - 95                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 75 - 95                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 75 - 95                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 75 - 95                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 75 - 95                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 75 - 95                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 75 - 95                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 75 - 95                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 75 - 95                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 75 - 95                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial ■ Época de plantio tolerada



## ARQUITETURA DE PLANTA

|                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3ª Posição / Terço Superior | 3.7%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Superior | 11.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Superior | 31.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Médio    | 2.5%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Médio    | 13.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Médio    | 30.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Inferior | 0%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Inferior | 1.3%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Inferior | 4.2%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vegetativo                  | 0.6%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# TMG 21 GLTP

- EXCELENTE QUALIDADE DE FIBRA
- TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA
- TOLERÂNCIA AO NEMATOIDE *ROTYLENCHULUS RENIFORMIS*

**EXIGÊNCIA DE  
REGULADOR**  
BAIXA

**TOLERÂNCIA À  
RAMULÁRIA**  
MÉDIA

**TOLERÂNCIA AO  
NEMATOIDE**  
*R. reniformis*

GlyTol®

LIBERTY  
LINK®

TwinLink®  
Plus



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **MÉDIO-PRECOCE**
- PESO CAPULHO (g): **4,6**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **41,9**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULÁRIA (*R. pseudoglycines*): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (*X. citri*): **RESISTENTE**
- RAMULOSE (*C. gossypii*): **TOLERANTE**
- NEMATOIDE (*R. reniformis*): **TOLERANTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

MICRONAIRE

**4,2**

RESISTÊNCIA  
[gFor/Text]

**31,2**

COMPRIMENTO (mm)

**30,7**

SFI (%)

**7,6**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 90 - 105                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 90 - 105                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 90 - 105                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 90 - 105                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 90 - 105                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 90 - 105                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 90 - 105                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 90 - 105                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 90 - 105                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 90 - 105                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial

■ Época de plantio tolerada



## ARQUITETURA DE PLANTA



|                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3ª Posição / Terço Superior | 0%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Superior | 1.8%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Superior | 18.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Médio    | 1.6%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Médio    | 15.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Médio    | 46.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Inferior | 0.3%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Inferior | 3.6%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Inferior | 7.3%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vegetativo                  | 4.9%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# TMG 22 GLTP

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- EXCELENTE RENDIMENTO E QUALIDADE DE FIBRA



GlyTol

LIBERTY  
LINK

TwinLink  
Plus



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **MÉDIO**
- PESO CAPULHO (g): **4,1**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **43,7**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

MICRONAIRE

**4,3**

RESISTÊNCIA  
[gFor/Text]

**30,2**

COMPRIMENTO (mm)

**29,7**

SFI (%)

**8,1**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 70 - 85                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 70 - 85                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 70 - 85                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 70 - 85                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 70 - 85                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 70 - 85                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 70 - 85                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 70 - 85                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 70 - 85                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 70 - 85                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial

■ Época de plantio tolerada



## ARQUITETURA DE PLANTA



|                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3ª Posição / Terço Superior | 0%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Superior | 3.6%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Superior | 19.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Médio    | 1.1%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Médio    | 16.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Médio    | 42.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Inferior | 0.2%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Inferior | 4.5%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Inferior | 6.7%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vegetativo                  | 5.2%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# TMG 29 TLP

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- ÓTIMO RENDIMENTO DE FIBRA
- FACILIDADE NO CONTROLE DA SOQUEIRA

21065TLP



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **MÉDIO**
- PESO CAPULHO (g): **4,4**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **45,0**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

MICRONAIRE

**4,5**

RESISTÊNCIA  
(gFor/Text)

**29,5**

COMPRIMENTO (mm)

**29,5**

SFI (%)

**8,4**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 80 - 100                 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial

■ Época de plantio tolerada



## ARQUITETURA DE PLANTA



|                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3ª Posição / Terço Superior | 0%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Superior | 3.6%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Superior | 19.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Médio    | 1.1%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Médio    | 16.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Médio    | 42.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Inferior | 0.2%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Inferior | 4.5%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Inferior | 6.7%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vegetativo                  | 5.2%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# TMG 66 GL

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- EXCELENTE QUALIDADE E RENDIMENTO DE FIBRA
- OPÇÃO PARA REFÚGIO

21066GL

**EXIGÊNCIA DE REGULADOR**  
ALTA

**TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA**  
MÉDIA

**PLANTE REFÚGIO**

**GlyToI** **LIBERTY LINK**



## CARACTERÍSTICAS

- CICLO: **TARDIO**
- PESO CAPULHO (g): **4,2**
- ALGODÃO 2ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- RENDIMENTO DE FIBRA (%): **45,8**
- ALGODÃO 1ª SAFRA: **RECOMENDADO**
- EXIGÊNCIA DE FERTILIDADE: **ALTA**



## REAÇÕES ÀS DOENÇAS

- DOENÇA AZUL: **RESISTENTE**
- RAMULÁRIA (R. pseudoglycines): **TOLERANTE**
- BACTERIOSE (X. citri): **RESISTENTE**
- RAMULOSE (C. gossypii): **TOLERANTE**



## CARACTERÍSTICAS DA FIBRA

**MICRONAIRE**

**3,9**

**RESISTÊNCIA**  
[gFor/Text]

**30,2**

**COMPRIMENTO (mm)**

**31,0**

**SFI (%)**

**7,4**

\*Dados médios obtidos através de ensaios realizados na safra 23/24. Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra. Rendimento de fibra realizado em máquina de serra.



## POSICIONAMENTO

| REGIÕES                 | POPULAÇÃO<br>(mil pl/ha) | NOV |    |    |    | DEZ |    |    |    | JAN |    |    |    | FEV |    |    |    |
|-------------------------|--------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                         |                          | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª  | 2ª | 3ª | 4ª |
| MT Sul                  | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Médio Norte (BR 163) | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Oeste (Parecis)      | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MT Vale do Araguaia     | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Sequeiro           | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| BA - Irrigado           | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| GO/MS                   | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MG/SP                   | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 1ª Safra        | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| MA/PI - 2ª Safra        | 70 - 90                  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

■ Época de plantio preferencial

■ Época de plantio tolerada



## ARQUITETURA DE PLANTA

|                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3ª Posição / Terço Superior | 0%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Superior | 3.3%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Superior | 7.7%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Médio    | 1.6%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Médio    | 16.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Médio    | 57.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Posição / Terço Inferior | 0%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Posição / Terço Inferior | 6.7%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Posição / Terço Inferior | 7.0%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vegetativo                  | 0%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Orientações Técnicas

## SEQUÊNCIA DE PLANTIO

### ABERTURA

TMG **91** WS3 TMG **88** B3XF

### ABERTURA | MEIO

TMG **31** B3RF TMG **84** B3XF TMG **38** B3RF TMG **47** B2RF

TMG **22** GLTP TMG **66** GL

### MEIO

TMG **83** B3XF TMG **51** WS3 TMG **21** GLTP TMG **29** TLP

TMG **63** XF

### MEIO | FECHAMENTO

TMG **33** B3RF TMG **44** B2RF

## EXIGÊNCIA DE REGULADOR

### ALTA

TMG **84** B3XF TMG **91** WS3 TMG **22** GLTP TMG **66** GL

### MÉDIA

TMG **83** B3XF TMG **88** B3XF TMG **63** XF TMG **38** B3RF TMG **33** B3RF

TMG **31** B3RF TMG **29** TLP TMG **51** WS3 TMG **44** B2RF

### BAIXA

TMG **47** B2RF TMG **21** GLTP

## TOLERÂNCIA À RAMULÁRIA

### ALTA

TMG **51** WS3 TMG **33** B3RF

### MÉDIA

TMG **83** B3XF TMG **84** B3XF TMG **88** B3XF TMG **31** B3RF

TMG **38** B3RF TMG **21** GLTP TMG **66** GL TMG **44** B2RF

TMG **47** B2RF

### BAIXA

TMG **91** WS3 TMG **22** GLTP TMG **29** TLP



## PLANTE REFÚGIO

Para que o refúgio seja efetivo, deve-se plantar sementes BT em 80% da área total de algodão e 20% de sementes não BT, respeitando uma distância máxima de 800 metros das áreas.

ÁREA MÍNIMA

**20%** NÃO BT

DISTÂNCIA MÁXIMA

**800 m**



ENCONTRE O  
*Licenciado*  
MAIS PRÓXIMO!



**FALE COM A** **TMG**



UM atendimento direto  
COM VOCÊ!





**TMG** / Inovação brasileira  
a serviço do campo  
Tropical Melhoramento & Genética



[in](#) [f](#) [@](#) [v](#) [tmgenetica](#)